

ВИЗОТИУМ

ЛЕВОФЛОКСАЦИН
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

НОВИНКА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗ —
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ!



ВИЗОТИУМ

 ПО РЕЦЕПТУ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С КЕРАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ПОВЫШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК И СОБАК



КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ
5 мг левофлоксацин (в форме гемегидрата)



5 мл



Клинически испытанная высокоэффективная офтальмологическая формула, разработанная специально для домашних питомцев



Не вызывает раздражения глаз



Произведено по GMP



Стимулирует заживление микроразрывов роговицы, снижая риск образования рубцов



Гиалуроновая кислота создает тонкую пленку на поверхности глаза, что обеспечивает длительное терапевтическое действие и увлажнение

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Визотиум относится к фармакотерапевтической группе – офтальмологические средства.

Левофлоксацин, входящий в состав препарата, является антибактериальным средством из группы фторхинолонов III поколения и оказывает бактерицидное действие. Обладая широким спектром антимикробной активности, левофлоксацин эффективен в отношении большинства клинически значимых возбудителей бактериальных инфекций глаз у собак и кошек, включая:

Грамположительные аэробы

- Staphylococcus spp.
(включая метициллин-чувствительные штаммы *S. aureus*, *S. pseudintermedius*)
- Streptococcus spp.

Грамотрицательные аэробы

- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella* spp.
- *Proteus* spp. (включая *P. mirabilis* и *P. vulgaris*)
- *Pasteurella* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Serratia* spp.

Внутриклеточные и атипичные микроорганизмы

- *Chlamydia* spp.
(включая *Chlamydia felis*)
- *Mycoplasma* spp.
(включая *Mycoplasma felis*)

Механизм действия левофлоксацина связан с ингибированием двух ключевых ферментов бактериальной клетки — ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы IV. Блокирование этих ферментов нарушает процессы репликации, суперспирализации и разделения дочерних молекул ДНК, что приводит к необратимым повреждениям и гибели бактериальной клетки.

При местном применении в форме глазных капель левофлоксацин хорошо проникает в ткани глаза, создавая терапевтические концентрации в роговице, конъюнктиве и водянистой влаге передней камеры глаза через 30–60 минут после инстилляций. Препарат выводится преимущественно со слезной жидкостью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Визотиум применяют собакам и кошкам для лечения острых и хронических бактериальных инфекций глаз и его придатков, вызванных чувствительными к левофлоксацину микроорганизмами, в том числе при:

- бактериальном блефарите,
- конъюнктивите,
- блефароконъюнктивите,
- бактериальном кератите и кератоконъюнктивите,
- дакриоцистите,
- мейбомииите,
- септической (инфицированной) язве роговицы,
- бактериальном иридоциклите,
- хламидийном конъюнктивите (в составе комплексной терапии),
- а также для лечения вторичных бактериальных инфекций, развивающихся на фоне вирусных поражений глаз (например, при герпесвирусе кошек).

Препарат также применяют для превентивного лечения состояний, связанных с неизбежной бактериальной контаминацией:

- при попадании инородного тела,
- проникающих ранениях глаза,
- травмах с нарушением целостности тканей,
- в периоперационный период при хирургических вмешательствах на глазном яблоке и веках.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Визотиум применяют кошкам и собакам путем закапывания 1-2 капли в конъюнктивный мешок пораженного глаза. При наличии обильного гнойного или слизисто-гнойного отделяемого предварительно проводят туалет глаза: закапывают 3-4 капли препарата, удаляют экссудат стерильным марлевым тампоном, после чего проводят инстилляцию терапевтической дозы препарата.

Режим дозирования:

ЗАБОЛЕВАНИЕ/ СОСТОЯНИЕ	КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ
	острая фаза (1-3 дня)	дальнейшее лечение (до выздоровления)	
Бактериальный конъюнктивит, блефароконъюнктивит	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	3-4 раза в день	7-14 дней
Бактериальный блефарит, мейбомиит	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)		14-21 дней
Бактериальный кератит, кератоконъюнктивит	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	от 14 до 28 дней*
Септическая (инфицированная) язва роговицы	каждые 30-60 мин в первые 2 часа, далее каждые 2-4 часа	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	
Бактериальный иридоциклит	4-6 раз в день (каждые 6-4 часов)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	7-14 дней
Хламидийный конъюнктивит (в составе комплексной терапии)	4-6 раз в день (каждые 6-4 часов)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	10- 14 дней
Дакриоцистит (острый)			
Вторичная бактериальная инфекция при вирусных поражениях	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)		5-7 дней
Профилактика при проникающих ранениях, травмах	4-6 раз в день (каждые 6-4 часов)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	7-10 дней
Периоперационная профилактика (до/после операции)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов) за 1-3 дня до операции	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов) в течение 7-14 дней после операции	8-17 дней

* При кератитах и язвах роговицы продолжительность лечения определяется до полной эпителизации под контролем ветеринарного врача.

Доза препарата, кратность применения и продолжительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного. При хронических и осложненных процессах может быть рекомендована комплексная терапия.

После использования флакон следует плотно закрывать. Во избежание контаминации раствора не допускать контакта кончика пипетки с поверхностью глаза, веками или иными поверхностями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Визотиум является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

Возможность применения лекарственного препарата животным в период беременности и лактации, а также потомству определяет лечащий врач на основании оценки соответствия пользы к возможному риску его применения.

При комбинированной терапии с другими офтальмологическими препаратами интервал между их введением должен составлять не менее 10 минут, глазные мази и гели применяются последними. При одновременном применении с системными фторхинолонами учитывают возможность потенцирования системных эффектов. Препарат совместим с топическими глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными средствами и кератопротекторами.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 30 суток.

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+

ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,
которые делают мир лучше каждый день



МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ

20 НОВИНОК
за 2025 год

22

ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТА



WWW.PETS.NITA-FARM.RU

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ООО «ВЕТАР»	ООО «ТК ЯРВЕТ»
ООО «ВЕТПРОДАКС»	ООО «АС-МАРКЕТ»
ООО «МОСЗООВЕТСНАБ»	ООО «БИОГРАНД»
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД»	ЗАО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ»
ООО «СИМБИО-УРАЛ»	ООО «КОТМАТРОС-ДИСТРИБЬЮЦИЯ»
ООО «СИБАГРО-ПРО»	

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ВКОНТАКТЕ



@nitafarmpets

ТЕЛЕГРАМ



@nitafarmpets

MAX



НИТА-ФАРМ | питомцы