

АМОКСИЦИЛЛИН 150



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОШЕК
И СОБАК ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ
НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА



Амоксициллин 15%
Суспензия для инъекций

АМОКСИЦИЛЛИН 150

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ
НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА



Новая рецептура
специально для мдж

- легко вводится
- хорошо переносится животными при подкожном введении



Контроль сырья
и производство
по стандартам GMP



Антибактериальный препарат



СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
150 мг/мл амоксициллина
тригидрат



20 мл



50 мл

ОПИСАНИЕ

Амоксициллин 150 представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета. Препарат выпускают расфасованным по 20 и 50 мл в стеклянные флаконы.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, – полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Actinobacillus spp.*, *Actinomyces spp.*, *Bacillus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Leptospira spp.*, *Listeria spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*

После парентерального введения препарата максимальная концентрация амоксициллина тригидрата в сыворотке крови достигается через 1-2 часа и удерживается на терапевтическом уровне в течение 48 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксициллин 150 применяют для лечения собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, пупочных инфекциях и других первичных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

	СОБАКИ	КОШКИ
Дозировка	1 мл на 10 кг массы тела животного	
Способ введения	Внутримышечно или подкожно	Подкожно
Длительность курса	Однократно. При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов	

Перед каждым применением суспензию следует тщательно взболтать.

Лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до комнатной температуры (20-25 °С).



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Противопоказанием к применению препарата Амоксициллин 150 является индивидуальная повышенная чувствительность животного к антибиотикам пенициллинового ряда, выраженные нарушения функций печени и/или почек
- Амоксициллин 150 не следует применять одновременно с другими β -лактамами препаратами, а также с бактериостатическими (тетрациклинами, макролидами, тиамфениколом и хлорамфениколом) антибиотиками, сульфаниламидами и фторхинолонами.
- Препарат не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 дней.



ВСЕ О НОВИНКАХ,
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

NITA-FARM PETS



Компания-производитель

ЛИДЕР В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТРАСЛИ

8 800 700 02 20 | WWW.NITA-FARM.RU

Партнёры

**ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТСНАБ»,
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ.