

ВЕМЕЛКАМ и ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ

МЕЛОКСИКАМ

НЕСТЕРОИДНЫЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



ПРОТИВ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ

ВЕМЕЛКАМ

Удобно для клиники

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ* ПРЕПАРАТ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК И СОБАК НА ОСНОВЕ МЕЛОКСИКАМА С УДОБНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ



Контроль сырья и производство по стандартам GMP

Выраженное действие против боли, воспаления и жара



Вводится подкожно и внутримышечно



Действует до 24 часов



Удобно для дома

ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ

ПРЕПАРАТ В ДВУХ ФОРМАХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК НА ОСНОВЕ МЕЛОКСИКАМА С ВЫРАЖЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ПРОТИВ БОЛИ, ВОСПАЛЕНИЯ И ЖАРА



Доступный селективный НПВП**



2 удобных формата таблеток с возможностью деления для разных весов - 0.5 мг и 2 мг



Облегченный прием, возможность задачи в виде суспензии



Привлекательный вкус и запах для требовательных питомцев



Контроль сырья и производство по стандартам GMP

*По результатам внутренних испытаний на базе ветеринарных клиник г. Саратова

** Нестероидный противовоспалительный препарат


УСТРАНЕНИЕ БОЛИ, ЖАРА И ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:



ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

При острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата и мягких тканей, сопровождающихся болью, воспалением и нарушением функции

(в т.ч. при переломах, травматической артропатии, растяжении связок, остеоартрите, артрозе, хронических дегенеративных заболеваниях суставов, миозитах, синовитах, спондилитах и т.п.)



РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

Верхних и нижних отделов дыхательной системы



МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Акушерско-гинекологических и урологических патологиях

(циститы, включая идиопатические)



БОЛЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

В том числе послеоперационных

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вемелкам относится к фармакотерапевтической группе: нестероидные противовоспалительные средства. Мелоксикам, входящий в состав препарата, оказывает противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НПВС

Механизм действия заключается в избирательном подавлении ферментативной активности циклооксигеназы-II (ЦОГ-2), в результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, боль и отёк. Незначительно воздействует на циклооксигеназу-I (ЦОГ-1), сводя к минимуму развитие побочных эффектов (в т.ч. кровотечения, образование язв в ЖКТ и нарушение функции почек).



ВЕМЕЛКАМ



Нестероидный противовоспалительный препарат



РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
2 мг/мл мелоксикама

20 мл 50 мл



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозировка

Первое введение

Последующие введения

СОБАКИ

по 0,1 мл на 1 кг массы тела животного
0,2 мг мелоксикама на 1 кг массы тела животного

по 0,05 мл на 1 кг массы тела животного
0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы тела животного

КОШКИ

Способ и кратность введения

Внутримышечно или подкожно, 1 раз в 24 часа

Длительность курса

До 5 дней подряд

До 3 дней подряд

В случае пропуска очередной дозы применение препарата следует возобновить в предусмотренных дозах по той же схеме применения. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ



Нестероидный противовоспалительный препарат



ТАБЛЕТКИ
для ПРИЁМА ВНУТРЬ



10 таблеток



ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ 0,5
0,5 мг мелоксикама



ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ 2
2 мг мелоксикама



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

	ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ 0,5		ВЕМЕЛКАМ СОЛЮТАБ 2
Дозировка	КОШКИ	СОБАКИ	СОБАКИ
Первый день	1 таблетка на каждые 5 кг массы тела животного 0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы тела животного	2 таблетки на каждые 5 кг массы тела животного 0,2 мг мелоксикама на 1 кг массы тела животного	2 таблетки на каждые 20 кг массы тела животного 0,2 мг мелоксикама
Последующие дни		1 таблетка на каждые 5 кг массы тела животного 0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы тела животного	1 таблетка на каждые 20 кг массы тела животного 0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы тела животного


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Определяется конкретным диагнозом и интенсивностью проявления клинических симптомов


- В острых случаях лечение продолжается в течение 5-7 дней
- У кошек продолжительность терапии не должна превышать 4 дней подряд
- При хроническом течении заболевания у собак возможно применение препарата в течение 28 дней под контролем ветеринарного врача

КАК ПРИГОТОВИТЬ СУСПЕНЗИЮ?

Для удобства применения возможно предварительно растворить таблетку в небольшом количестве воды и задать с помощью шприца для инъекций без иглы перорально.




Выберите шприц для инъекций без иглы объемом от 5-ти мл или от 10-ти мл, в зависимости от таблетки




Выньте шток поршня шприца. Разделите таблетку и поместите внутрь шприца, после чего установите шток на место




Наберите воду в шприц. Указан минимально необходимый объем воды для растворения ¼ таблетки



Оставьте шприц в состоянии покоя на 10 минут



После пройденного времени встряхните шприц до получения однородной смеси



Задайте полученную суспензию питомцу

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- повышенная чувствительность животных к мелоксикаму
- язва желудка и 12-перстной кишки
- выраженная почечная, печеночная и сердечная недостаточность
- геморрагический синдром
- животные в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии

НЕ СЛЕДУЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ С:

- другими нестероидными противовоспалительными препаратами
- глюкокортикостероидами
- диуретиками
- антикоагулянтами,
- аминогликозидными антибиотиками
- антиагрегантами (ацетилсалициловой кислотой, клопидогрелом)
- селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (флуоксетином)

НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ:

- беременным и лактирующим самкам
- щенкам и котятм моложе 6-недельного возраста



ВЕМЕЛКАМ— ПОБЕЖДАЕТ БОЛЬ И ВОСПАЛЕНИЕ!

НИТА-ФАРМ - ключевая инновационная компания ветеринарной
фармацевтики России



PETS.NITA-FARM.RU



ИНСТРУКЦИЯ ПО
РАСТВОРЕНИЮ ТАБЛЕТОК
В ФОРМАТЕ «СОЛЮТАБ»



ВСЕ О НОВИНКАХ,
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

NITA-FARM PETS

Где купить

**ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТСНАБ», ООО «СИБАГРО ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»,
ООО «СИБАГРО-ПРО», ООО «ТК ЯРВЕТ», ЗАО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ»**

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.