

МАВЕДИН®

ПИМОБЕНДАН
ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

НОВИНКА

В НАДЁЖНОМ
РИТМЕ



МАВЕДИН



НАДЕЖНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ВАШЕГО ПИТОМЦА
В БОРЬБЕ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ,
ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ВКУСОМ



ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПРИЁМА ВНУТРЬ



50 таблеток



МАВЕДИН 1,25
1,25 мг пимобендана



МАВЕДИН 5
5 мг пимобендана





МАВЕДИН 10
10 мг пимобендана



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Действующим веществом лекарственного препарата является пимобендан – производное бензимидазол-пиридазинона, обладающий положительным инотропным (увеличение силы сокращения сердечной мышцы) и вазодилатирующим (сосудорасширяющим) действием.



Снижает нагрузку на сердце,
расширяя кровеносные сосуды

Улучшает сократимость сердца,
усиливая его выброс и эффективность
сердцебиения



Облегчает симптомы сердечной недостаточности
и улучшает качество жизни вашего животного



Повышает силу сердечных сокращений
и обладает сосудорасширяющим эффектом




Точность дозирования
любому животному обеспечивается
возможностью деления таблетки на 4 части
и форматами - 1.25 мг, 5 мг, 10 мг



РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЗАРУБЕЖНОМУ АНАЛОГУ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Маведин сопоставим по составу, свойствам и механизму действия с известным зарубежным аналогом, что гарантирует его высокую эффективность при лечении.




РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ



БЕССИМПТОМНАЯ СТАДИЯ

Длительное пероральное применение пимобендана (Маведин) увеличивает период до появления клинических признаков застойной сердечной недостаточности по причине заболевания сердца и гибели питомца по сравнению с собаками, получавшими плацебо.

- на 15 месяцев при миксоматозной дегенерации митрального клапана¹:




- на 9 месяцев при дилатационной кардиомиопатии (у доберман-пинчеров)²:



СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ СТАДИЯ

Препарат на основе пимобендана по сравнению с беназеприлом демонстрирует увеличения выживаемости у собак с хронической сердечной недостаточностью на 90%, при использовании в сочетании с другой стандартной терапией³:



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Маведин назначают собакам:

- для лечения сердечной недостаточности, вызванной дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) на бессимптомной (предклинической) и клинической стадиях заболевания;
- при миксоматозной дегенерации двустворчатого или трёхстворчатого клапана на клинической стадии;
- при миксоматозной дегенерации митрального клапана на бессимптомной (предклинической) стадии заболевания.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозировка

Назначают собакам в суточной дозе от 0,2 мг до 0,6 мг на 1 кг массы тела животного.
Суточную дозу разделяют на 2 равных приема

Способ и кратность введения

Перорально индивидуально за 0,5–1 час до кормления.
Применение препарата с кормом может снизить его биодоступность

Длительность курса

Доза препарата, кратность применения и продолжительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного.
При застойной сердечной недостаточности препарат применяют собакам пожизненно с индивидуальным подбором дозы

ДОЗЫ МАВЕДИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА ЖИВОТНОГО

Наиболее удобным является применение Маведин 1,25 животным массой тела до 5 кг, Маведин 5 – от 5 до 20 кг, Маведин 10 – от 20 кг.

Масса тела животного, кг	Суточная доза, мг	Количество таблеток на 1 животное в один прием, шт. (задавать 2 раза в день – утром и вечером)		
		МАВЕДИН 1,25	МАВЕДИН 5	МАВЕДИН 10
< 3	0,6	 1/4	–	–
4–5	1,25	 1/2	–	–
5–10	2,5	 1	 1/4	–
11–20	5	 2	 1/2	 1/4
21–30	7,5	–	 3/4	 1/4
31–40	10	–	 1	 1/2
41–50	15	–	 1 1/2	 3/4
51–60	20	–	 2	 1
> 61	30	–	 3	 1 1/2

Рекомендованная доза для достижения клинического эффекта – 0,5 мг на 1 кг массы животного в сутки.

Для более точного определения дозы, соответствующей массе тела животного, таблетка может быть разделена по линиям разлома.

На фоне лечения пимобенданом собак, страдающих сахарным диабетом, рекомендовано регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- при гипертрофической кардиомиопатии и клинических состояниях, при которых не может быть увеличен сердечный выброс крови из-за функциональных или анатомических особенностей (например, стеноз аорты)
- при тяжелых поражениях печени (в связи с процессом метаболизма лекарственного средства в данном органе)
- животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

- самкам в период беременности и вскармливания потомства

¹ Effect of Pimobendan in Dogs with Preclinical Myxomatous Mitral Valve Disease and Cardiomegaly: The EPIC Study—A Randomized Clinical Trial: A. Boswood, J. Häggström, S.G. Gordon, G. Wess, R.L. Stepien, M.A. Oyama, B.W. Keene, J. Bonagura, K.A. MacDonald, M. Patteson, S. Smith, P.R. Fox, K. Sanderson, R. Woolley, V. Szatmári, P. Menaut, W.M. Church, M. L. O'Sullivan, J. P. Jaudon, J. G. Kresken, J. Rush, K.A. Barrett, S.L. Rosenthal, A.B. Saunders, I. Ljungvall, M. Deinert, E. Bomassi, A.H. Estrada, M.J. Fernandez Del Palacio, N.S. Moise, J.A. Abbott, Y. Fujii, A. Spier, M.W. Luethy, R.A. Santilli, M. Uechi, A. Tidholm, P. Watson

² Efficacy of pimobendan in the prevention of congestive heart failure or sudden death in Doberman Pinschers with preclinical dilated cardiomyopathy (the PROTECT Study): N J Summerfield 1, A Boswood, M R O'Grady, S G Gordon, J Dukes-McEwan, M A Oyama, S Smith, M Patteson, A T French, G J Culshaw, L Braz-Ruivo, A Estrada, M L O'Sullivan, J Loureiro, R Willis, P Watson

³ Effect of Pimobendan or Benazepril Hydrochloride on Survival Times in Dogs with Congestive Heart Failure Caused by Naturally Occurring Myxomatous Mitral Valve Disease: The QUEST Study: J. Häggström, A. Boswood, M. O'Grady, O. Jöns, S. Smith, S. Swift, M. Borgarelli, B. Gavaghan, J.-G. Kresken, M. Patteson, B. Åblad, C.M. Bussadori, T. Glaus, A. Kovačević, M. Rapp, R.A. Santilli, A. Tidholm, A. Eriksson, M.C. Belanger, M. Deinert, C.J.L. Little, C. Kvar, A. French, M. Rønn-Landbo, G. Wess, A.V. Eggertsdottir, M.L. O'Sullivan, M. Schneider, C.W. Lombard, J. Dukes-McEwan, R. Willis, A. Louvet, R. DiFrancia

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, **но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,**
которые делают мир лучше каждый день



МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ

20
ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ

22 НОВЫХ ПРОДУКТА
ВЫПУЩЕНО ЗА 2024 ГОД

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТСНАБ»,
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ», ООО «СИБАГРО-ПРО»,
ООО «ТК ЯРВЕТ», ЗАО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ», ООО «АС-МАРКЕТ»,
ООО «КОТМАТРОС-ДИСТРИБЬЮЦИЯ», ООО «БИОГРАНД»

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

НАШ САЙТ



WWW.PETS.NITA-FARM.RU

НАШ ТГ-КАНАЛ ВСЕ О НОВИНКАХ,
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
И КОНСУЛЬТАЦИИ



[@nitafarmpets](https://t.me/nitafarmpets)