

# НО-ПРЕЗАН® и НО-ПРЕЗАН® ТАБ

ДРОТАВЕРИН  
СПАЗМОЛИТИК МИОТРОПНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
БЕЗ КОМПРОМИССОВ



СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО  
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

СКОРО В ПРОДАЖЕ

# НО-ПРЕЗАН®



**ВЕТЕРИНАРНЫЙ СПАЗМОЛИТИК СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОЗИРОВКАМИ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ ВВЕДЕНИЕМ ДЛЯ УДОБНОГО И ЛЕГАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОШКАМ И СОБАКАМ**



РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ  
20 мг дротаверина в 1 мл



20 мл



Безопасное применение в клинике



Безболезненное введение препарата



Лекарственная форма,  
адаптированная для кошек и собак



Действие уже со второй минуты



## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

### СОБАКИ

### КОШКИ

**Дозировка (разовая)**

1-3 мг дротаверина гидрохлорида на 1 кг м.т.ж.

**Способ применения**

Внутримышечно, подкожно

**Длительность курса**

Продолжительность курса лечения устанавливается ветеринарным специалистом индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного

Суточная доза не должна превышать 3 мг дротаверина гидрохлорида на 1 кг массы тела животного. Допускается деление суточной дозы на 2-3 приема.

## НО-ПРЕЗАН ПРИМЕНЯЮТ СОБАКАМ И КОШКАМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СПАЗМОВ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, СВЯЗАННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:



### ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

воспалительной природы (холецистит, перихолецистит, холангит), желчнокаменной болезни (холецистолитиаз, холангиолитиаз)



### ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

воспалительной природы (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, энтерит, колит, синдром раздраженного кишечника с метеоризмом), спастической природы (пилороспазм, ахалазия кардии, спастический колит с запором)



### МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

воспалительной природы (пиелит, уроцистит, уретерит, уретрит), мочекаменной болезни (нефролитиаз, уретролитиаз, цистолитиаз, уротеролитиаз), спазма мочевого пузыря (болезненные тенезмы, идиопатический цистит)



### ДЛЯ СНЯТИЯ СПАЗМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЙ В ПОСЛЕРОДОВОЙ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

при проведении некоторых инструментальных исследований (катетеризация мочевого пузыря, ретроградная уроцистография и т. д.)



### ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ: ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

(простатит, эндометрит, вульвит)

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата,
- повышенная чувствительность к бисульфиту натрия,
- тяжелая печеночная или почечная недостаточность,
- тяжёлая сердечная недостаточность,
- глаукома,
- сниженное артериальное давление (артериальная гипотензия),
- АВ-блокада II-III степени

### НЕ СЛЕДУЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ С:

- папаверином,
- бендазолом и другими спазмолитиками (в том числе м-холиноблокаторами),
- уменьшает спазмогенную активность морфина,
- фенobarбитал повышает спазмолитического действия дротаверина

### С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

- беременным и лактирующим самкам

НОВИНКА

# НО-ПРЕЗАН® ТАБ



ВЕТЕРИНАРНЫЙ СПАЗМОЛИТИК СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОЗИРОВКАМИ И АДАПТИРОВАННЫМ ДЛЯ ХОРОШЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ ВКУСОМ И ЗАПАХОМ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЗАДАЧИ КОШКАМ И СОБАКАМ ВСЕХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ



ТАБЛЕТКИ  
ДЛЯ ПРИЁМА ВНУТРЬ



10 таблеток



НО-ПРЕЗАН ТАБ 40  
40 мг дротаверина

НО-ПРЕЗАН ТАБ 20  
20 мг дротаверина

НО-ПРЕЗАН ТАБ 4  
4 мг дротаверина



Один из наиболее безопасных  
спазмолитиков



Легкая задача препарата  
домашним питомцам



3 концентрации дротаверина  
для удобной и безопасной  
задачи животным



Легальное применение в ветеринарии



## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

### СОБАКИ

### КОШКИ

1-3 мг дротаверина гидрохлорида на 1 кг м.т.ж.

#### Дозировка (разовая)

Наиболее удобным является применение  
Но-презан ТАБ 4 животным массой тела до 5 кг,  
Но-презан ТАБ 20 – животным массой тела от 5 до 20 кг,  
Но-презан ТАБ 40 – животным массой тела от 20 кг.

#### Способ применения

Перорально

#### Длительность курса

Продолжительность курса лечения устанавливается ветеринарным специалистом индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного

Суточная доза не должна превышать 3 мг дротаверина гидрохлорида на 1 кг массы тела животного. Допускается деление суточной дозы на 2-3 приема.

## ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НО-ПРЕЗАН ТАБ?



### УДОБНЫЙ ФОРМАТ ТАБЛЕТОК

Таблетки с рисками для деления на 4 части в 3 концентрациях для разных весовых категорий



### АДАПТИРОВАННАЯ РЕЦЕПТУРА

Улучшенный вкус и аромат, привлекающий питомца



### СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Безопасное устранение проблемы у питомца



### ПРОИЗВЕДЕН ПО СТАНДАРТАМ GMP

Постоянная доступность и регистрация в РФ



### ЛЕГАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Разработан специально для кошек и собак



## ОСОБЕННОСТЬ

Но-презан относится к группе спазмолитики миотропные.

Входящий в состав препарата дротаверин представляет собой производное изохинолина.

Дротаверин - проявляет мощное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру за счет ингибирования фермента фосфодиэстеразы (ФДЭ). Ингибирование фермента ФДЭ приводит к повышению концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), что инактивирует легкую цепочку киназы миозина (MLCK), что, в свою очередь, ведет к расслаблению гладкой мускулатуры.

In vitro дротаверин ингибирует изофермент ФДЭ-4 без ингибирования изоферментов ФДЭ-3 и ФДЭ-5. Поэтому эффективность дротаверина зависит от активности ФДЭ-4, содержание которого в разных тканях различное. ФДЭ-4 наиболее важен для подавления сократительной активности гладкой мускулатуры, в связи с чем его селективное ингибирование может быть полезным для лечения гиперкинетических заболеваний и различных заболеваний, сопровождающихся спастическим состоянием желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание ФДЭ-4 отмечается в желче- и мочевыводящих путях, матке, желудочно-кишечном тракте.

Гидролиз цАМФ в миокарде и гладких мышцах кровеносных сосудов происходит, главным образом, с помощью ФДЭ-3, поэтому дротаверин меньше влияет на сердечно-сосудистую систему. Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нейрогенного, так и мышечного происхождения. Независимо от типа вегетативной иннервации дротаверин расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочеполовой системы.

При парентеральном введении дротаверин быстро всасывается. Биодоступность - 100 %. Начало действия - через 2–4 мин. Связывание с белками плазмы – до 98%. Равномерно распределяется в тканях, проникает в гладкомышечные клетки. Не проникает через ГЭБ; дротаверин и/или его метаболиты могут незначительно проникать через плацентарный барьер. Дротаверин почти полностью метаболизируется в печени. (T1/2) дротаверина составляет 8–10 ч. В течение 72 ч дротаверин практически полностью выводится из организма. Около 50 % выводится почками и около 30 % - через ЖКТ. Дротаверин главным образом экскретируется в виде метаболитов, неизменная форма дротаверина в моче не обнаруживается.



Для записи

Blank lined page for writing.



# НО-ПРЕЗАН и НО-ПРЕЗАН ТАБ

Лучшие мировые инновации для благополучия ваших питомцев со стремлением к совершенству в разработках и продуктах



ВСЕ О НОВИНКАХ,  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
И КОНСУЛЬТАЦИИ

**NITA-FARM PETS**



Компания-производитель

**ЛИДЕР В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТРАСЛИ**

8 800 700 02 20 | [WWW.NITA-FARM.RU](http://WWW.NITA-FARM.RU)

Партнёры

**ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТСНАБ»,  
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.