



# КСИЛАНИТ®



СЕДАТИВНОЕ И МИОРЕЛАКСИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ КСИЛАЗИНА  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ



РАСТВОР  
20 мг ксилазин



20 мл



Снижает беспокойство животных  
при проведении ветеринарных  
обработок



Обездвиживает животных  
для проведения легких оперативных  
вмешательств



## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

### СОБАКИ

### КОШКИ

#### Дозировка

**0,5-1,0 мл на 10 кг массы  
тела животного**  
(1-2 мг ксилазина гидрохлорида  
на 1 кг массы тела животного)

**0,15 мл на 1 кг массы  
тела животного**  
(3 мг ксилазина гидрохлорида  
на 1 кг массы тела животного)

#### Способ применения

Внутримышечно

Внутримышечно  
или подкожно

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Ксиланит предназначен для применения собакам и кошкам с целью успокоения, обезболивания и миорелаксации при проведении клинического осмотра, рентгенологических исследований, для обездвиживания беспокойных и агрессивных животных, в том числе во время транспортировки; в качестве средства премедикации при оперативных вмешательствах, болезненных манипуляциях, а также для общей анестезии.

Животных до наступления полного действия препарата не следует беспокоить. Если необходимая глубина седации не достигнута, дополнительные инъекции для достижения желаемого эффекта не рекомендуются.

Животные после применения лекарственного препарата Ксиланит должны находиться под наблюдением до полной нормализации их физиологического состояния.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ксиланит является антагонистом центральных  $\alpha_2$ -адренорецепторов, оказывает успокаивающее, миорелаксирующее и обезболивающее действие, стимулирует как центральные, так и периферические альфа-рецепторы.

При парентеральном введении вызывает быстрое наступление диссоциированной анестезии. После внутримышечного или подкожного введения начало действия лекарственного препарата наступает через 5-20 минут, при внутривенном введении - через 1-5 минут. Продолжительность успокаивающего действия колеблется у мелких домашних животных от 1 до 2 часов.

Болеутоляющее действие сохраняется у мелких животных от 15 до 30 минут. Миорелаксирующее действие у животных наступает через 20-50 минут.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Самкам в последнюю треть беременности в связи с окситоциноподобным эффектом на матку (кроме случаев родовспоможения).
- Животным при механическом повреждении желудочно-кишечного тракта (закупорка пищевода, заворот желудка, грыжа).
- Животным с нарушением проводимости сердечной мышцы в анамнезе.

### С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

- Животным при болезнях легких



## КСИЛАНИТ

Лучшие мировые инновации для благополучия Ваших питомцев  
со стремлением к совершенству в разработках и продуктах



ВСЕ О НОВИНКАХ,  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
И КОНСУЛЬТАЦИИ

**NITA-FARM PETS**



Компания-производитель

**ЛИДЕР В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТРАСЛИ**

8 800 700 02 20 | [WWW.NITA-FARM.RU](http://WWW.NITA-FARM.RU)

Партнёры

**ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТНАБ»,  
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.