

ТИЛОЗИН ТАБ

ТИЛОЗИН
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

НОВИНКА

ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВО
ТЕПЕРЬ И В ТАБЛЕТКАХ



ТИЛОЗИН ТАБ



ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТИЛОЗИН В ТАБЛЕТКАХ – УДОБНАЯ ФОРМА ПОПУЛЯРНОГО И ПРОВЕРЕННОГО АНТИБИОТИКА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖКТ, МОЧЕПОЛОВЫХ И РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КОШЕК И СОБАК



ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПРИЁМА ВНУТРЬ



10 таблеток
(для ТИЛОЗИН ТАБ 40МГ и 200 мг)



10 таблеток
(для ТИЛОЗИН ТАБ 400МГ)

ТИЛОЗИН ТАБ 40
40 мг тилозина

ТИЛОЗИН ТАБ 200
200 мг тилозина

ТИЛОЗИН ТАБ 400
400 мг тилозина



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилозин, входящий в состав препарата, оказывает бактериостатическое действие на:

Грамположительные
аэробные бактерии

Bacillus spp.

Listeria spp.

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Erysipelothrix spp.

Corynebacterium spp.

Анаэробные

грамположительные бактерии

Enterococcus spp.

Clostridium spp.

Arcanobacterium spp.

Грамотрицательные
аэробные бактерии

Actinobacillus spp.

Haemophilus spp.

Moraxella spp.

Bordetella spp.

Lawsonia spp.

Campylobacter spp.

Escherichia spp.

Pasteurella spp.

Pasteurella multocida

Анаэробные грамотрицательные
бактерии

Fusobacterium spp.

Микоплазмы

Mycoplasma spp.

Спирохеты

Borrelia spp.

Brachyspira spp.

Leptospira spp.

Хламидии


Chlamydia spp.

Простейшие

Cryptosporidium spp.



Эффективен для ротации в протоколах
лечения респираторных заболеваний



Удобная лекарственная форма
популярного антибиотика



Привлекательный запах
и улучшенный вкус



Механизм действия тилозина связан с торможением биосинтеза белка рибосомами бактерий (нарушается образование пептидных связей между аминокислотами и пептидной цепью).

Тилозин ТАБ выводится из организма преимущественно с фекалиями, в меньшей степени - через почки и с молоком.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ























Тилозин ТАБ применяют кошкам и собакам для лечения желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, вызванных бактериальными инфекциями, при вторичных инфекциях, вызванных вирусными заболеваниями, а также при инфекциях, вызванных чувствительными к тилозину микроорганизмами.

Препарат назначают в разовой дозе 10 мг тилозина (в форме основания) на 1 кг массы тела животного 1 раз в 12 часов. При тяжелых формах течения болезни и при колите доза может быть увеличена вдвое и составлять 20 мг тилозина (в форме основания) на кг массы тела животного.

Тилозин ТАБ применяют кошкам и собакам перорально индивидуально или с небольшим объемом корма. Прием корма не влияет на биодоступность действующих веществ лекарственного препарата.

ДОЗЫ ТИЛОЗИН ТАБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА ЖИВОТНОГО

Наиболее удобным является применение Тилозин ТАБ 40 – животным массой тела до 5 кг, Тилозин ТАБ 200 – животным массой тела от 5 до 20 кг, Тилозин ТАБ 400 – животным массой тела от 20 кг.

Масса тела животного, кг	ТИЛОЗИН ТАБ 40	ТИЛОЗИН ТАБ 200	ТИЛОЗИН ТАБ 400
0,5-1	 ¼	-	-
2	 ½	-	-
3	 ¾	-	-
4	 1	-	-
5	 1¼	 ¼	-
6-10	-	 ½	-
11-15	-	 ¾	-
16-20	-	 1	 ½
21-25	-	 1¼	-
26-30	-	 1½	 ¾
31-35	-	 1¾	-
36-40	-	 2	 1
41-45	-	 2¼	-
46-50	-	 2½	 1¼
51-60	-	-	 1½
61-70	-	-	 1¾
71-80	-	-	 2

Продолжительность курса лечения Тилозин ТАБ составляет 5-7 суток. В случае хронических и трудно излечимых заболеваний курс лечения может составлять 10-14 дней. При необходимости доза, кратность и курс лечения могут быть скорректированы лечащим ветеринарным врачом в зависимости от тяжести течения заболевания и состояния животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- почечная и печеночная недостаточность
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата

НЕ СЛЕДУЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ С:

- тиамулином
- клиндамицином
- левомицетином
- пенициллинами (особенно с ампициллином и оксациллином)
- цефалоспоридами и линкомицином в связи с выраженным снижением антибактериального эффекта тилозина

НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ:

- самкам в период беременности и лактации

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после вскрытия первичной упаковки – 4 месяца.





ТИЛОЗИН ТАБ

Признанное средство теперь и в таблетках

НИТА-ФАРМ - ключевая инновационная компания ветеринарной
фармацевтики России



PETS.NITA-FARM.RU



ВСЕ О НОВИНКАХ,
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

NITA-FARM PETS

Где купить

**ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТСНАБ», ООО «СИБАГРО ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»,
ООО «СИБАГРО-ПРО», ООО «ТК ЯРВЕТ», ЗАО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ»**

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.